



# Krankheitsregelung Tagesbetreuung Thal- Rheineck Kita Zwerglihuus

## Zustand des Kindes

Oft stellt sich die Frage, ab wann behalte ich mein Kind zu Hause oder ab wann schicken wir die Kinder nach Hause. Um etwas Klarheit in diese sehr individuellen Situationen zu bringen, helfen Internetportale meist nur wenig, da sie sehr unterschiedliche Antworten liefern.

Grundsätzlich muss ein Kind mit einer infektiösen Krankheit nicht zwingend von der Kindertagesstätte ausgeschlossen werden. Ein Ausschluss hängt ab:

- vom Allgemeinzustand des Kindes: benötigt ein Kind im Allgemeinzustand einen höheren Betreuungsaufwand als ein gesundes Kind oder hat es Fieber (38.0 C), kann es nicht in der Kita betreut werden.
- vom Erreger der Erkrankung bez. Art der Erkrankung (siehe Auflistung).

Erkranken Kinder während des Aufenthalts in der Kita, sind die Eltern verpflichtet die Kinder so schnell wie möglich abzuholen.

Wir beziehen uns auf die Empfehlungen zum Ausschluss von infektiös erkrankten Kindern und Jugendlichen, sowie Kontaktpersonen vom Gesundheitsdepartement des Kanton St. Gallen. Allerdings kann es zu situationsbedingten Abweichungen kommen, da jedes Kind und der damit verbundene Krankheitsverlauf und Allgemeinzustand sehr individuell sein können. Das Wohl des Kindes steht für uns an erster Stelle. Auch kann es zu einem situationsabhängigen Ausschliessen kommen, wenn viele Kinder oder Betreuungspersonen an derselben Krankheit erkrankt sind. Dies entscheiden Ärzte, Kanton und Kommission. Wir tun dies, um die anderen Kinder, die Angehörigen und unser Personal zu schützen. Es dürfen keine fiebersenkenden Medikamente verabreicht werden, wenn die Kinder die Kita besuchen.

Wir setzen auf eine verständnisvolle und ehrliche Kommunikation.

Vielen Dank.



Krankheiten ohne Ausschluss, wenn die Kinder einen guten und fieberfreien Allgemeinzustand haben:

- Angina (Viral)
- Bronchitis, Bronchopneumonie (ohne Tuberkulose)
- Coxsackie-Virus-Infektion
- Dellwarzen / Mollusken (offene Dellwarzen müssen abgedeckt sein)
- Dreitagefieber
- Furunkulose
- Grippe oder grippale Infekte
- Hand-Mund-Fuss Krankheit
- Hepatitis B, Hepatitis C
- Herpes Zoster /Gürtelrose
- HIV-Infektion
- Impetigo (bakterielle Hauterkrankung)
- Kopfläuse (wenn sie bereits min. 1-mal behandelt wurden)
- Krätze (wenn es bereits behandelt wurde)
- Laryngitis /Kehlkopfentzündung
- Lungenentzündung (ausser Lungentuberkulose)
- Multiresistente Keime (MRSA, ESBL etc., nur in Absprache mit behandelnder Kinderärztin!)
- Mundsoor und Windelsoor
- Pfeiffersches Drüsenfieber
- Pilzinfektion der Haut und Kopfhaut (Wenn es bereits behandelt wurde)
- Pseudokrupp
- Ringelröteln
- Stomatitis / Herpes
- Tuberkulose, ausserhalb der Lunge
- Warzen
- Windeldermatitis / Windelausschlag



- Wurmbefall im Stuhl
- Zytomegalie-Virus

Krankheiten **mit** Ausschluss:

- |   |  |
|---|--|
| ○ Adenoviren-konjunktivitis / Bindehautentzündung | Rückkehr möglich gemäss Entscheid des behandelnden Arztes oder nach dem Abklingen der Rötung   |
| ○ Streptokokken Angina                            | Rückkehr 24 Stunden nach Start der Antibiotikatherapie und gutem Allgemeinzustand  |
| ○ Scharlach                                       | Rückkehr 24 Stunden nach Start der Antibiotikatherapie und gutem Allgemeinzustand  |
| ○ Durchfall / Magendarmgrippe                     | Rückkehr nach symptomfreien 24 Stunden (Durchfall und Erbrechen) und gutem Allgemeinzustand  |
| ○ Hepatitis A mit Durchfall                       | Rückkehr 6 Tage nach dem ersten Durchfall und gutem Allgemeinzustand   |
| ○ Keuchhusten / Pertussis                         | Rückkehr möglich gemäss Entscheid des behandelnden Arztes, frühestens 5 Tage nach dem Start der Antibiotikatherapie und nach 21 Tagen ohne |
| ○ Masern  | Rückkehr frühestens nach 5 Tagen und gutem Allgemeinzustand  |
| ○ Meningokokken-meningitis / Hirnhautentzündung   | Rückkehr möglich gemäss Entscheid des behandelnden Arztes  |



- |   |   |
|---|---|
| ○ Mumps                                 | Rückkehr nach 6 Tagen nach Beginn der Entzündung und gutem Allgemeinzustand                 |
| ○ Norovirus                             | Rückkehr nach symptomfreien 24 Stunden (Durchfall und Erbrechen) und gutem Allgemeinzustand |
| ○ Röteln                                | Rückkehr nach 6 Tagen nach Beginn des Ausschlags und gutem Allgemeinzustand                 |
| ○ Tuberkulose                           | Rückkehr möglich gemäss Entscheid des behandelnden Arztes                                   |
| ○ Typhus/Paratyphus, nur wenn Durchfall | Rückkehr nach symptomfreien 24 Stunden (Durchfall) und gutem Allgemeinzustand               |
| ○ Windpocken                            | Rückkehr erst wenn alle Bläschen komplett verkrustet sind                                   |

Wichtig ist folgender Ablauf:

- Bei Erkrankung in der Kita, Eltern informieren (Symptome beschrieben, wir stellen keine Diagnose, dies soll beim Arzt abgeklärt werden).
- Informieren euch die Eltern nicht über etwas (Eltern anrufen und Information von ihnen einfordern).
- Fieber = ab 38.0 C

# Kinderkrankheiten

3-Tage-Fieber

## Ansteckungszeitraum:

3 Tage vor dem Fieber, bis zu Beginn des Ausschlags

## Symptome:

- Ca. 3 Tage Fieber
- Husten Durchfall, Erbrechen
- Lidschwellungen
- Lymphknotenschwellung am Hals

## Arztkonsultation:


Meldepflicht und Abklärung



## Ab wann darf ihr Kind wieder in die Kita:

1 Tag fieberfrei und bei gutem Allgemeinzustand des Kindes.

# Krankheiten



## **Ansteckungszeitraum:**

Von der Ansteckung bis zum Ausbruch vergehen etwa 2-5 Tage. Jedoch ist ein Patient bis zu zwei Wochen ansteckend.

## **Symptome:**

Starke Halsschmerzen, Schluckbeschwerden, hohes Fieber, gerötete und geschwollene Mandeln


## **Ab wann darf ihr Kind wieder in die Kita:**

Mindestens 1 Tag fieberfrei nach Behandlung mit Antibiotika und  
Alltagstauglich

## **Arztkonsultation:**

Meldepflicht und Abklärung

# Krankheiten



**Ansteckungszeitraum:**

5 bis 12 Tage

**Arztkonsultation:**

Meldepflicht und Abklärung

**Symptome:**

Rötung des Auges, gelegentlich eine Schwellung des Lides, brennen und jucken des Auges, Drang zu reiben

**wann darf ihr Kind wieder in die Kita kommen:**

Nach Ärztlicher Behandlung.



# Kinderkrankheiten



## Ansteckungszeitraum:

Meist zwischen 2 und 10 Tagen. Ohne Behandlung ist der/die Erkrankte so lange ansteckend, bis alle offenen, eitrigen Hautstellen abgeheilt sind.

## Arztkonsultation:

Meldepflicht und Abklärung

## Symptome:

Ausschlag um den Mund und Nase

## Ab wann darf ihr Kind wieder in die Kita:

24 Stunden nach Beginn einer Behandlung mit Antibiotika.

# Krankheiten



**Arztkonsultation:**  
Meldepflicht und Abklärung



**Ansteckungszeitraum:**

Die Zeit zwischen Ansteckung und Auftreten von Dellwarzen kann von 2 Wochen bis zu 3 Monaten betragen.

**Symptome:**

Teilweise Juckreiz, Rötung und Schwellung der Umliegenden Haut.


**Wann darf ihr Kind wieder in die Kita kommen:**

Das Kind darf die Kita besuchen jedoch müssen die Warzen mit einem Pflaster abgedeckt werden und mit Textil bedeckt sein zusätzlich muss das Team informiert werden.

# Krankheiten



## Erkältung



### **Ansteckungszeitraum:**

Solange man Symptome hat, etwa 10 Tage

### **Symptome:**

Schnupfen, verstopfte oder laufende Nase, Husten, Halsschmerzen, Fieber, Mattigkeit, Kopf und Gliederschmerzen

### **Ab wann darf ihr Kind wieder in die Kita kommen:**

1 Tag Fieberfrei und Alltagstauglich

### **Arztkonsultation:**

Meldepflicht und Abklärung

# KINDERKRANKHEITEN

## Gürtelrose



### **Ansteckungszeitraum:**

2 Tage vor bis 6 Tage nach dem Auftreten der ersten Bläschen, gleicher Virus wie Windpocken.

### **Symptome:**

der Variazella- Zoster -Virus löst bei Menschen mit bereits durchgemachten Windpocken in Kindertagen die Gürtelrose aus, im Gegenzug können sich Menschen bei Personen welche die Gürtelrose haben mit Windpocken anstecken.

Symptom gleich wie Windpocken und ansteckend bis die letzten Bläschen ausgetrocknet sind.


### **Ab wann darf ihr Kind wieder in die Kita:**

Kein Ausschluss bei gutem Allgemeinzustand des Kindes. Bläschen sollten komplett verkrustet sein.

### **Arztkonsultation:**

Meldepflicht und Abklärung

# Kinderkrankheiten



## **Ansteckungszeitraum:**

3 Tage vor und bis 7 Tage nach auftreten des ersten Ausschlags. Personen sind ansteckend solange die Symptome anhalten.

## **Symptome:**

Flache Bläschen und Ausschlag an Händen, Füßen und Mund, starker Juckreiz

## **Arztkonsultation:**

Meldepflicht und Abklärung

## **Ab wann darf ihr Kind wieder in die Kita:**

Kein Ausschluss bei einem guten Allgemeinzustand des Kindes

# Krankheiten

## Hautpilz

### Ansteckungszeitraum:

Nach etwa einer Woche entsprechender Behandlung sind Betroffene nicht mehr ansteckend

### Symptome:

Rötungen, Schuppungen, Ekzeme, Juckreiz, Pusteln, Der Ausschlag kann sich teils rasch auf der Haut ausbreiten, Haarausfall, gelbliche oder Braune Verfärbungen des Nagels

### Arztkonsultation:

Meldepflicht und Abklärung

### Ab wann darf ihr Kind wieder in die Kita:

kein Ausschluss bei gutem Allgemeinzustand des Kindes



# Krankheiten



Influenza-Virus

## Ansteckungszeitraum:

Erste Beschwerden spührt man etwa 1 bis 2 Tage nach der Ansteckung. Die Erkrankten können bereits am Tag vor Beginn der Beschwerden und bis ca. 1 Woche nach Auftreten der ersten Krankheitszeichen ansteckend sein.

## Symptome:

Fieber, Husten, oder Halsschmerzen sowie Muskel-und/oder Kopfschmerzen teilweise auch Schwäche, Schweissausbrüche, Übelkeit, Erbrechen oder Durchfall

## Ab wann darf ihr Kind wider in die Kita kommen:

Symptomfrei und Alltagstauglich, mindestens 1 Tag fieberfrei

## Arztkonsultation:

Meldepflicht und Abklärung

# Kinderkrankheiten

## Keuchhusten

### Ansteckungszeitraum:

Vom Auftreten des ersten Hustens an bis etwa 5 Wochen.  
Ansteckung wird durch Antibiotika nach 14 Tagen gestoppt

### Symptome:

1 bis 2 Wochen unspezifischer Husten und Schnupfen dann 4 - 6 Woche anfallartige Hustenattacken mit zähem Schleim, manchmal mit anschliessendem Erbrechen. Nach 6 - 10 Wochen klingen die Hustenattacken ab.

### Arztkonsultation:

Meldepflicht und Abklärung.

### Ab wann darf ihr Kind wieder in die Kita:

Der Ausschluss gilt bis zur Genesung, frühestens mit Antibiotikum nach 5 Tagen und keinen Begleitsymptomen, ohne Antibiotikum nach 21 Tagen.



# Kinderkrankheiten



## **Ansteckungszeitraum:**

Bei einer ersten Ansteckung treten die Beschwerden erst nach 2 bis 5 Wochen, bei einer Wiederansteckung bereits nach 1 bis 4 Tagen auf.

## **Symptome:**

Brennen der Haut und Juckreiz, der bei Bettwärme besonders stark ausgeprägt ist

## **Wann darf ihr Kind wieder in die Kita kommen:**

Nach einer Behandlung

## **Arztkonsultation:**

Meldepflicht und Abklärung

# ACHTUNG!



Läuse

## Ansteckung:

Solange die Person von Läusen betroffen ist, sind sie durch direkten Kontakt übertragbar

## Symptome:

Kitzeln auf der Kopfhaut, Juckreiz

## Wann darf ihr Kind wieder in die Kita kommen:

Nach einmaliger Behandlung der Haare



# KRANKHEITEN



Lungenentzündung

## **Arztkonsultation:**

Meldepflicht und Abklärung

## **Ansteckungszeitraum:**

Zwischen 2 und 5 Tagen



## **Symptome:**

Schüttelfrost, Husten mit Auswurf, Brustschmerzen wie auch Schmerzen beim Einatmen, Schwäche, Atemnot, Fieber teilweise

## **Ab wann darf ihr Kind wieder in die Kita kommen:**

Je nach Zustand des Kindes, sollte beachtet werden dass ein Kind nach einer Lungenentzündung sehr geschwächt und anfälliger für Krankheiten ist.

# Krankheiten



## Ansteckungszeitraum:

in der Regel zwischen 6 Stunden und 2 Tagen



## Symptome:

Bauchschmerzen, Übelkeit, Blähungen, Durchfall, Fieber, Appetitlosigkeit, Kopfschmerzen, Erbrechen

## Ab wann darf ihr Kind wieder in die Kita:

24 Stunden Fieberfrei, kein Durchfall, kein Erbrechen und Alltagstauglich



## Arztkonsultation:

Meldepflicht und Abklärung

# Kinderkrankheiten

## Masern

### **Ansteckungszeitraum:**

3 Tage vor Beginn des Ausschlags, bis zu seinem verschwinden

### **Symptome:**

Zu Beginn: Fieber, Husten, Schnupfen, Bindehautentzündung.

Nach einigen Tagen: Hinter den Ohren beginnender mittel- bis grossfleckiger Ausschlag am gesamten Körper, zusätzlich weissliche Flecken auf der Wangenschleimhaut.

### **Arztkonsultation:**

Meldepflicht und Abklärung.

### **Ab wann darf ihr Kind wieder in die Kita:**

Der Ausschluss gilt bis zur Genesung (Bis Ausschlag verschwunden), jedoch frühestens 5 Tage nach Ausbruch des Hautausschlags.



# Kinderkrankheiten



## **Ansteckungszeitraum:**

3 Tage vor und bis 9 Tage nach Beginn der Schwellung der Drüsen.

## **Symptome:**

Fieber und allgemeines Unwohlsein (Krank sein), geschwollene Speicheldrüsen ( Ohr- und Unterkieferbereich), Kopf-, Bauch-, Hodenschmerzen mit Schwellung und Rötung.

## **Arztkonsultation:**

Meldepflicht und Abklärung

## **Ab wann darf ihr Kind wieder in die Kita:**

Rückkehr nach 6 Tagen nach Beginn der Entzündung und gutem Allgemeinzustand.

# Krankheiten



## **Ansteckungszeitraum:**

Nach der Ansteckung bricht die Erkrankung meist schnell aus, in der Regel zwischen 6 Stunden und 2 Tagen. Die Betroffenen sind mit dem Auftreten der Krankheitszeichen hoch ansteckend. Bis etwa 48 Stunden nach Abklingen der Beschwerden werden relativ viele Erreger mit dem Stuhl ausgeschieden.

## **Arztkonsultation:**

Meldepflicht und Abklärung

## **Symptome:**

Heftiges Erbrechen und Durchfall, Bauch-Muskel-Kopfschmerzen, Fieber, Mattigkeit

## **Ab wann darf ihr Kind wieder in die Kita:**

24 Stunden Symptomfrei, kein Durchfall, kein Erbrechen wie bei Magendarm.

# Kinderkrankheiten

## Ringelröteln

### Ansteckungszeitraum:

4 bis 10 Tage nach der Infektion ist die Ansteckungsgefahr am grössten. Bei Auftreten der Rötungen besteht praktisch keine Infektionsgefahr mehr.

### Symptome:

Anfangs: Gesichtsrötung, dann an Armen und Beinen girlandenförmiger, geringelter Ausschlag, selten Fieber oder körperliche Beeinträchtigung

### Ab wann darf ihr Kind wieder in die Kita:

Nach Auftreten der Rötungen und Abklingen der Symptome. Guter Allgemeinzustand



### Arztkonsultation:

Meldepflicht und Abklärung

# Kinderkrankheiten



## **Ansteckungszeitraum:**

7 Tage vor Beginn des Ausschlags bis 10 Tage nach seinem Abklingen

## **Symptome:**

Anfangs leichtes Fieber, Husten und Schnupfen zum späteren Zeitpunkt folgt mittelfleckiger Ausschlag mit Beginn hinter den Ohren sowie Schwellungen der Lymphknoten im Nackenbereich.

## **Arztkonsultation:**

Meldepflicht und Abklärung

## **Ab wann darf ihr Kind wieder in die Kita:**

Der Ausschluss gilt bis zur völligen Genesung frühestens 6 Tage nach Beginn des Ausschlags.

# Kinderkrankheiten



Scharlach

## Ansteckungszeitraum:

Mit den ersten Symptomen bis 2 Tage nach Beginn der Behandlung mit Penicillin.

## Symptome:

Feinfleckiger, Sandpapierartige Rötung in den Leisten, Achseln und am Rumpf, gelegentlich im Gesicht mit Aussparung des Mundbereichs. Hochroter Rachen und Gaumen, Schwellung der Halslymphknoten, belegte Zunge die später Himbeerfarben wird. Fieber evtl. Bauchschmerzen mit Erbrechen.

## Ab wann darf ihr Kind wieder in die Kita:

Der Ausschluss gilt bis zur Genesung, frühestens mit Antibiotikum nach 24 Stunden.

## Arztkonsultation:

Meldepflicht und Abklärung

# Kinderkrankheiten



Windpocken

## Ansteckungszeitraum:

2 Tage vor und bis 6 Tage nach dem Auftreten der ersten Bläschen.

## Symptome:

Fieber, Schläppheit, mit Flüssigkeit gefüllte Bläschen, die aufplatzen und verkrusten. Bläschen am gesamten Körper sowie auf der Kopfhaut.


## Arztkonsultation:

Meldepflicht und Abklärung

## Ab wann darf ihr Kind wieder in die Kita:

Der Ausschluss gilt bis zur Genesung, frühestens wenn alle Bläschen verkrustet sind

# Krankheiten



## **Ansteckungszeitraum:**

Wurmeier sind gewöhnlich bis zu 5 Tage ansteckend. Bis die Würmer Eier legen, vergehen nach Ansteckung etwa 2 bis 6 Wochen.

## **Symptome:**

Allgemeines Unwohl sein, Gewichtsverlust, Appetitlosigkeit, Bauchschmerzen

## **Arztkonsultation:**

Meldepflicht und Abklärung

## **Ab wann darf ihr Kind wieder in die Kita:**

Kein Ausschluss bei gutem Allgemeinzustand des Kindes

